

Palliatief (overleving controlegroep > 12 maanden), effectiviteit <ul style="list-style-type: none"> • primair eindpunt • mediane follow-upduur • winst overleving (> 16 weken en HR < 0,70) • winst progressievrije overleving (> 16 weken en HR < 0,70) 	rPFS 18,6 maanden niet matuur BRCA1/2-mutatie (tumor of kiembaan): 16,6 versus 10,9 maanden HR: 0,53 [95%-BI: 0,36-0,79]; p = 0,001)		+
ESMO-MCBS-gradering			3
Bijwerkingen <ul style="list-style-type: none"> • lethaal < 5% • acuut, ernstig < 25% • chronisch beperkend • dosisreductie • staken behandeling vanwege bijwerkingen 	<i>niraparibgroep</i> 5% 67% 20% 11%	<i>controlegroep</i> 3% 46% 3% 5%	+ +
Kwaliteit van leven <ul style="list-style-type: none"> • kwaliteit-van-levenanalyse 	niet verschillend		
Impact van behandeling <ul style="list-style-type: none"> • behandellast 	acceptabele behandellast		
Bewijskracht	1 fase III-studie		
Medicijnkosten <ul style="list-style-type: none"> • kosten niraparib per 28 dagen • mediane behandelduur • totale behandelkosten 	€ 4698 13,8 maanden € 70.468		

Resultaten van de MAGNITUDE-studie afgezet tegen de PASKWIL2023-criteria voor palliatieve behandeling bij mediane overleving in de controlegroep > 12 maanden.