

<b>Palliatief</b> (overleving controlegroep > 12 maanden), <b>effectiviteit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• primair eindpunt</li> <li>• mediane follow-upduur</li> <li>• winst overleving (&gt; 16 weken en HR &lt; 0,70)</li> <li>• winst progressievrije overleving (&gt; 16 weken en HR &lt; 0,70)</li> </ul>	progressievrije overleving 22 maanden geen significant verschil HR: 0,66 (95%-BI: 0,54-0,81); p < 0,001 mediane PFS 24,8 versus 16,6 maanden		+
<b>ESMO-MCBS-gradering</b>			2
<b>Bijwerkingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lethaal &lt; 5%</li> <li>• acuut, ernstig &lt; 25%</li> <li>• chronisch beperkend</li> <li>• dosisreductie</li> <li>• staken behandeling vanwege bijwerkingen</li> </ul>	<i>olaparibgroep</i> 0% 56% nee 23% 17%	<i>controlegroep</i> < 1% 43% nee 6% 9%	+ +
<b>Kwaliteit van leven</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kwaliteit-van-levenanalyse</li> </ul>	geen verschil tussen beide groepen		
<b>Impact van behandeling</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• behandellast</li> </ul>	acceptabele behandellast		?
<b>Bewijskracht</b>	1 fase III-studie		
<b>Medicijnkosten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kosten olaparib per 28 dagen</li> <li>• mediane behandelduur</li> <li>• totale behandelkosten</li> </ul>	€ 5.417 18,5 maanden € 108.813		

Resultaten van de PROpel-studie afgezet tegen de PASKWIL2023 criteria voor palliatieve behandeling bij mediane overleving in de controlegroep > 12 maanden.