Palliatief (overleving controlegroep > 12 maanden), **effectiviteit** · primair eindpunt · mediane follow-upduur · winst overleving (> 16 weken en HR < 0,70) · winst progressievrije overleving (> 16 weken en HR < 0,70)	 PFS bij dMMR-groep, PFS in ITT-groep, OS in ITT-groep analyse PFS: 25 maanden, analyse OS: 37,2 maanden ITT: 44,6 versus 28,2 maanden (HR: 0,69 [95%-BI: 0,54-0,89]; p = 0,002 dMMR: niet bereikt versus 31,4 maanden (HR: 0,32 [95%-BI: 0,17-0,63]; p = 0,0002 dMMR: niet bereikt versus 7,7 maanden (HR: HR: 0,28 [95%-BI:0,16-0,50]; p < 0,001)		 + +
ESMO-MCBS-gradering			4
Bijwerkingen · lethaal < 5% · acuut, ernstig < 25% · chronisch beperkend · dosisreductie · staken behandeling vanwege bijwerkingen	*dostarlimabgroep* 2% 51% 17%	*controlegroep* 0 46% 9%	 + + +
Kwaliteit van leven · kwaliteit-van-levenanalyse	 niet verschillend tijdens chemotherapie		 +
Impact van behandeling · behandellast	 acceptabele behandellast		 +
Bewijskracht	1 fase III-studie		
Medicijnkosten · kosten per 28 dagen · mediane behandelduur · totale behandelkosten	 onbekend 43 weken (10 cycli) onbekend		

Resultaten van de RUBY-studie afgezet tegen de PASKWIL2023-criteria voor palliatieve behandeling bij mediane overleving in de controlegroep > 12 maanden.

site.print_copyright